

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM

TOT (Transobturatorní páska)

Diagnóza, která vede k provedení zdravotního výkonu:

Inkontinence (únik) moče

Popis zdravotního výkonu:

Účelem tohoto zdravotního výkonu je odstranění úniku moče spojeného se zvýšením nitrobřišního tlaku, při kašli, smíchu, pohybu, kýchnutí. Celkově tak zlepšit kvalitu života.

Zdravotní výkon bude probíhat takto:

Po přípravě (oholení, podání nízkomolekulárního heparinu, podání antibiotik), v celkové anestezii, v poloze na zádech, s dolními končetinami zavěšenými tak, aby byla přístupná oblast pochvy a hráze (tzv. gynekologická poloha), je veden krátký řez podélně na přední stěně poševní, 1,5 cm pod ústím močové trubice, okraje pochvy jsou uvolněny směrem k raménkům kosti stydké, v rýze mezi pochvou a stehnem je vytvořen skalpelem průchod kůží a tudíž proniknuto zavaděčem přes oblast pánevního okna a po prstech ven pochvou. Pomocí zavaděče je protažena páska, která je volně uložena pod střední částí močové trubice. Pochva je sešita, do pochvy na jeden den vložena tamponáda, která se odstraňuje za 12-24 hodin. Na 1 den je zavedena močová cévka, která odvádí moč do sběrného sáčku. Po odstranění cévky je sledováno vyprazdňování měchýře. Odchod do domácího léčení je možný následující den po operaci, výjimečně déle. Po odchodu do domácího léčení je nutné dodržování klidového režimu, hygieny v podobě sprchování, není vhodné koupání. **Intimní styk je možný po uplynutí 6-8 týdnů.** Úspěšnost operace se pohybuje kolem 95 %.

Možná rizika doporučeného zdravotního výkonu:

Krvácení v oblasti operace, bezprostředně po výkonu, dále možnost infekce a komplikovaného hojení, při použití pásky pak její částečné či větší odhojení, s průnikem do pochvy. Výjimečně pak možnost močové píštěle, tedy komunikace mezi močovou trubicí a pochvou, měchýřem a pochvou. Nutno konstatovat, že celkové množství komplikací se pohybuje kolem 5 %.

Výjimečně může dojít k neschopnosti vyprázdnění měchýře s potřebou dočasně využívat k vyprázdnění speciální cévku po návratu.

V 9-10 % se objevuje dráždivý močový měchýř s nutkavým pocitem k vyprázdnění, potřebou rychle vyhovět, častým močením. Stav je dlouhodobě léčen medikamenty.

Vzácnou komplikací výkonu může být tromboembolická příhoda, zhoršení interního či neurologického stavu, v závislosti na věku a přidružených chorobách.

Kromě uvedených komplikací může během výkonu dojít k dalším vzácným komplikacím. Komplikace mohou vést k nutnosti operačního výkonu, hospitalizace a další léčby, ve velmi vzácných případech až k trvalému postižení nebo úmrtí pacienta. Pacient si dále uvědomuje, že provedením zdravotního výkonu nemusí být dosaženo očekávaného výsledku.

Poučení o případných alternativách shora uvedeného lékařem doporučeného výkonu, jejich přednostech, rizicích:

Subslizniční aplikace látky (tzv. bulking agens) do močové trubice

Výhody: ještě menší invazivita, po operaci pacientka naprosto bez jakýchkoliv omezení

Nevýhoda: možnost vstřebání látky v poměrně krátkém čase do 1 měsíce s potřebou opakovat výkon v celkové anestezii, bolesti v oblasti močové trubice, nízký komfort močení

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

Urologické oddělení

MUDr. Jaroslav Ženíšek, Ph. D, primář

Předpokládaná doba hospitalizace: zpravidla 3 dny

Údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po provedení příslušného výkonu, lze-li takové předpokládat:

Klidový režim, absence koupání a intimního styku, delší pracovní neschopnost v závislosti vykonávané činnosti (delší u fyzicky náročné profese).

Souhlas nemocného s výkonem:

Prohlašuji, že jsem byl lékařem úplně a srozumitelně poučen o povaze svého onemocnění a plánovaném výkonu. Byl jsem poučen i o alternativách léčby a možných důsledcích v případě neprovedení tohoto výkonu. Během poučení jsem měl možnost klást lékařovi doplňující otázky, a pokud tomu tak bylo, byly mi úplně a srozumitelně zodpovězeny. Jsem si vědom všech rizik i komplikací spojených s tímto výkonem. Byl jsem poučen o tom, že mohu svůj souhlas s výkonem odvolat a také o tom, že odvolání souhlasu není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušování může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života. Poučení jsem rozuměl a s výkonem souhlasím.

Jméno a příjmení pacienta.....

Rodné číslo pacienta.....

V Jihlavě dne: **Podpis pacienta**.....

Podpis lékaře.....