

## INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM

### Kalibrace uretry či dilatace uretry (močové trubice)

Kalibrace uretry se provádí k diagnostice zúženin močové trubice, a to kalibrační sondou s několika olivkami ke stanovení stupně zúžení. Dilatace uretry znamená rozšíření močové trubice, užívá se k léčbě zúžení močové trubice, k tomu se používají katétry, sondy či bužie.

Kalibrace se nejčastěji se provádí při opakovaných zánětech močových cest k vyloučení zúžení močové trubice, dilatace pak jako konzervativní postup v léčbě zúženin močové trubice.

**Alternativou** dilatace uretry může být v určitých případech endoskopické řešení zúžení uretry v anestezii (optická uretrotomie).

Základní nevyžaduje žádnou přípravu.

**Provádí se** v poloze na zádech, po dezinfekci zevního ústí močové trubice a následné aplikaci znečistivujícího gelu se do močové trubice zavádí cévka, sonda či bužie, často se sonda nechává v močové trubici několik minut. U žen i mužů lze tento zákrok provést ambulantně ve slizniční anestezii / není nutné interní předoperační vyšetření/. Na přání pacienta však lze tento zákrok provést i v celkové či svodné anestezii, avšak již za krátkodobé hospitalizace s nutností interního předoperačního vyšetření

**Délka samotného zákroku** je několik vteřin až minut v případě dilatace, zavedení sondy je nepříjemné až mírně bolestivé.

Po výkonu je třeba dodržovat pitný režim a klidový režim minim. 24 hodin. Pokud by 24hodin po výkonu přetrvávaly potíže jako pálení a řezání při močení, bolesti, krvácení a zvýšené teploty, dostavte se k akutnímu ošetření či kontrole na urologii.

**Komplikace** po tomto výkonu nejsou příliš časté ani závažné. Jde většinou o pocity řezání a pálení v močové trubici, ojediněle může nastat krvácení z močové trubice či prostaty.

Obtíže většinou během několika hodin odezní. Jiné komplikace, jako například zvýšená teplota či zástava močení jsou vzácné, ojediněle může po výkonu nastat zánět dolních močových cest / zánět močové trubice s následným vznikem zúžení, zánět močového měchýře, i mužů pak i zánět prostaty, varlat a nadvarlat /. Pokud není zánět dolních cest močových včas léčen, může dojít k rozvoji zánětu i na horní cesty močové /ledviny/ s následným rozvojem celkové infekce organismu, tzv. sepse.

K těmto komplikacím přistupujeme s preventivním opatřením u rizikových pacientů. Komplikace se při výskytu dají vždy řešit.

### Souhlas nemocného s výkonem:

Prohlašuji, že jsem byl lékařem úplně a srozumitelně poučen o povaze svého onemocnění a plánovaném výkonu. Byl jsem poučen i o alternativách léčby a možných důsledcích v případě neprovedení tohoto výkonu. Během poučení jsem měl možnost klást lékaři doplňující otázky, a pokud tomu tak bylo, byly mi úplně a srozumitelně zodpovězeny. Jsem si vědom všech rizik i komplikací spojených s tímto výkonem. Byl jsem poučen o tom, že mohu svůj souhlas s výkonem odvolat a také o tom, že odvolání souhlasu není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušování může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života. Byl jsem informován a vzal jsem na vědomí, že předpokládaného výsledku uvedeného zdravotního výkonu nemusí být dosaženo. Poučení jsem rozuměl a s výkonem souhlasím.

**Jméno a příjmení pacienta:**.....

**Rodné číslo pacienta:**.....

**V Jihlavě dne:** ..... **Podpis pacienta:**.....

**Podpis lékaře:**.....