

## INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM

### Snesení kondylomat

Akuminátní kondylomata /„genitální bradavice“/ jsou důsledkem virové infekce. Při neúspěšné konzervativní (nechirurgické) terapii nebo při větším lokálním nálezů přistupujeme k jejich chirurgickému odstranění.

**Výkon bývá proveden** v anestézii celkové (budete spát), svodné (budete při vědomí, ale bolest nebudete vnímat), event. lokální (nebudete cítit jen okolí oper.oblasti), dle rozsahu onemocnění. Menší ložiska sneseme, větší pak vytínáme a ránu či rány pak sešíváme jednotlivými stehy.

O výběru anestézie /znecitlivění/ rozhoduje lékař při konzultaci s pacientem. Výkon prováděný ve svodné či celkové anestezii vyžaduje krátkodobou hospitalizaci. Zákroky prováděné ve svodné či celkové anestezii vyžadují předoperační vyšetření, které zajistí Váš praktický lékař.

Drobné výkony, které provádíme jen v lokální anestezii, nevyžadují předoperační vyšetření ani žádnou speciální přípravu. Ta je nutná jen u pacientů, kteří užívají léky ovlivňující srážení krve /např. Anopyrin, Warfarin, Godasal, Plavix apod./

Žádné pracoviště ani lékař Vám nemohou zaručit ideální či nekomplikovaný průběh zákroku či hojení rány. **Komplikace** v průběhu operačního výkonu mohou být krvácení, alergická reakce na podání znecitlivující látky, bolest, kolapsový stav /mdloba,slabost/. Mezi nejčastější pooperační komplikace patří krvácení a objevení se hematomu v ráně, infekce v ráně a rozpad rány. Léčba komplikací může být ambulantní, ale může si vyžádat i hospitalizaci. Mezi pozdními komplikacemi se může objevit bolest v jizvě a okolí, nevzhledná jizva /keloid/, barevné změny v jizvě. Častá pak bývá recidiva onemocnění vzhledem k infekční povaze základního onemocnění.

**Alternativou** v některých případech může být lokální terapie speciálními roztoky, či použití kapalného dusíku, vzácně i imunoterapie.

Výkon není příliš časově náročný, pracovní schopnost bývá omezená od několika dnů do 2 týdnů. V případě použití šicího materiálu, vzhledem k používání vstřebatelného materiálu, není nutno extrahovat stehy. Důležité jsou pravidelné kontroly a ev. převazy rány dle doporučení ošetřujícího lékaře.

### Souhlas nemocného s výkonem:

Prohlašuji, že jsem byl lékařem úplně a srozumitelně poučen o povaze svého onemocnění a plánovaném výkonu. Byl jsem poučen i o alternativách léčby a možných důsledcích v případě neprovedení tohoto výkonu. Během poučení jsem měl možnost klást lékařovi doplňující otázky, a pokud tomu tak bylo, byly mi úplně a srozumitelně zodpovězeny. Jsem si vědom všech rizik i komplikací spojených s tímto výkonem. Byl jsem poučen o tom, že mohu svůj souhlas s výkonem odvolat a také o tom, že odvolání souhlasu není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušování může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života. Poučení jsem rozuměl a s výkonem souhlasím.

**Jméno a příjmení pacienta:**.....

**Rodné číslo pacienta:**.....

**V Jihlavě dne:** ..... **Podpis pacienta:**.....

**Podpis lékaře:**.....