

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM

Urodynamické vyšetření

Jedná se o funkční vyšetření dolních močových cest. Vyšetření je schopno posoudit chování především močového měchýře při plnění a také během močení. Z vyšetření lze posoudit souhra mezi jednotlivými strukturami močových cest.

Jde o často jediný způsob, jak diagnostikovat některé závažné choroby dolních močových cest, zejména funkční poruchy močení. Metoda nemá plnohodnotnou alternativu v jiných vyšetřeních.

Vyšetření nevyžaduje žádnou přípravu.

Po dezinfekci zevního ústí močové trubice a následně aplikaci znečitlivujícího gelu se do močové trubice zavádí tenká cévka se snímačem až do močového měchýře, další snímač se pak zavádí do konečníku či se nalepí na okraj řitního otvoru.

Obvykle se zahajuje vyšetřením, při kterém se močový měchýř plní postupně tekutinou až do pocitu nucení na močení za současného měření tlaků, objemů a dalších parametrů, vyšetření se zakončí vymočením do nádoby, kdy se zhodnotí průtok močovou trubicí.

Délka trvání tohoto vyšetření je několik desítek minut, vyšetření nebývá bolestivé, ale spíše nepříjemné.

Výkon se zpravidla provádí ambulantně

Po výkonu je třeba dodržovat pitný režim a klidový režim minim. 24 hodin. Pokud by 24hodin po výkonu přetrvávaly potíže jako pálení a řezání při močení, bolesti, krvácení a zvýšené teploty, dostavte se k akutnímu ošetření či kontrole na urologii.

Komplikace po tomto výkonu nejsou příliš časté ani závažné. Jde většinou o pocity řezání a pálení v močové trubici, ojediněle může nastat krvácení z močové trubice či prostaty.

Obtíže většinou během několika hodin odezní. Jiné komplikace, jako například zvýšená teplota či zástava močení jsou vzácné, ojediněle může po výkonu nastat zánět dolních močových cest / zánět močové trubice s následným vznikem zúžení, zánět močového měchýře, i mužů pak i zánět prostaty, varlat a nadvarlat /. Pokud není zánět dolních cest močových včas léčen, může dojít k rozvoji zánětu i na horní cesty močové /ledviny/ s následným rozvojem celkové infekce organismu, tzv. sepse.

K těmto komplikacím přistupujeme s preventivním opatřením u rizikových pacientů. Komplikace se při výskytu dají vždy řešit.

Souhlas nemocného s výkonem:

Prohlašuji, že jsem byl lékařem úplně a srozumitelně poučen o povaze svého onemocnění a plánovaném výkonu. Byl jsem poučen i o alternativách léčby a možných důsledcích v případě neprovedení tohoto výkonu. Během poučení jsem měl možnost klást lékařovi doplňující otázky, a pokud tomu tak bylo, byly mi úplně a srozumitelně zodpovězeny. Jsem si vědom všech rizik i komplikací spojených s tímto výkonem. Byl jsem poučen o tom, že mohu svůj souhlas s výkonem odvolat a také o tom, že odvolání souhlasu není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušování může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života. Poučení jsem rozuměl a s výkonem souhlasím.

Jméno a příjmení pacienta:.....

Rodné číslo pacienta:.....

V Jihlavě dne: **Podpis pacienta:**.....

Podpis lékaře:.....