

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM

Ascendentní ureteropyelografie

Ascendentní ureteropyelografie je endoskopické a RTG vyšetření k zobrazení dutého systému ledviny a močovodu, pokud jiné zobrazovací metody (vylučovací urografie, CT, SONO) nepřináší kompletní a dostatečné zobrazení vývodných močových cest.

Nejčastěji se provádí při nedostatečném zobrazení vývodných močových cest na vylučovací urografii, k průkazu zúžení močovodu či přechodu ledvinné pánvičky nebo nádoru močovodu a ledvinné pánvičky. Jde o často jediný způsob, jak vyloučit některé závažné choroby vývodných močových cest, vyšetření nemá plnohodnotnou alternativu v zobrazovacích metodách.

Vyšetření nevyžaduje žádnou přípravu, je ale vhodné, aby byl pacient před vyšetřením vymočen. Provádí se obvykle v takzvané litotomické či gynekologické poloze, tedy v poloze na zádech s pokrčenými a roztaženými dolními končetinami, vyšetření se většinou provádí jak v místním znecitlivění, je možné jej provést i v celkové anestézii.

Popis zdravotního výkonu

Po dezinfekci zevního ústí močové trubice a následné aplikaci znecitlivujícího gelu se do močové trubice postupně zavádí endoskop až do močového měchýře, tzv. cystoskop / pevný kovový nebo ohebný nástroj o průměru asi 10 mm, opatřený optikou, zdrojem světla a případně i kamerou, možností plnění, močových cest tekutinou /. Po vyšetření močového měchýře a identifikaci ústí močovodu se provede jeho sondáž pomocí tenkého katétru /cévky/, poté následuje nástřik močovodu kontrastní látkou za současného RTG snímkování. Monitoruje se též odtok kontrastní látky z vývodných močových cest.

Pokud je Vám známo, že jste alergičtí na jodovou kontrastní látku, je nutné na tuto skutečnost upozornit lékaře!

V těhotenství se tento výkon nemůže provést, protože je při něm používáno rentgenové záření. Délka trvání tohoto vyšetření je několik minut, vyšetření nebývá příliš bolestivé, ale spíše nepříjemné, zejména u mužů vzhledem k délce močové trubice. Po výkonu je třeba dodržovat pitný režim.

Komplikace zdravotního výkonu

Komplikace po tomto výkonu nejsou příliš časté, mohou souviset se zaváděním cystoskopu do močového měchýře a s podrážděním sliznice močové trubice, jde většinou o pocity řezání a pálení v močové trubici, může nastat i krvácení z močové trubice. Tyto obtíže většinou během několika hodin odezní. Vzácnější, ale závažnější komplikací je zavlečení infekce do urotraktu s horečkami nebo poranění močové trubice, močového měchýře, močovodu nebo ledvinné pánvičky, toto poranění je možno řešit zavedením močového katétru nebo stentu do močovodu. Možnou komplikací může být i alergická reakce na kontrastní látku či znecitlivující gel. Jiné komplikace jako například zástava močení jsou vzácné. Alergická reakce na podanou kontrastní látku vzniká nezávisle na množství podané kontrastní látky a její příčina není zcela známá. Může probíhat jako mírná reakce s výskytem vyrážky, nevolnosti či mírných dechových obtíží. V případě závažné alergické reakce může dojít až k rozvoji závažného stavu a anafylaktického šoku, který i při zavedené léčbě může vést ke smrti pacienta. Tato

reakce se většinou objevuje do několika minut po podání kontrastní látky. Pozdní reakce se vyvíjí 3-48 hodin po podání kontrastní látky. Většinou se jedná o výsev vyrážky kdekoli na těle.

Prohlašuji, že jsem byl(a) lékařem úplně a srozumitelně poučen o povaze svého onemocnění a plánovaném výkonu. Byl(a) jsem poučen(a) i o alternativách léčby a možných důsledcích v případě neprovedení tohoto výkonu. Během poučení jsem měl(a) možnost klást lékařovi doplňující otázky, a pokud tomu tak bylo, byly mi úplně a srozumitelně zodpovězeny. Jsem si vědom(a) všech rizik i komplikací spojených s tímto výkonem. Byl(a) jsem poučen(a) o tom, že mohu svůj souhlas s výkonem odvolat a také o tom, že odvolání souhlasu není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušování může způsobit vážné ohrožení zdraví nebo ohrožení života. Byl(a) jsem informován(a) a vzal(a) jsem na vědomí, že předpokládaného výsledku uvedeného zdravotního výkonu nemusí být dosaženo. Poučení jsem rozuměl(a) a s výkonem souhlasím.

Jméno a příjmení pacienta

Rodné číslo pacienta

V Jihlavě dne:

Podpis pacienta /zákonného zástupce.....

Podpis lékaře.....