


## INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM

### Cystoureteroskopie s extrakcí ureterálního stentu

Jde o kontrolní endoskopické vyšetření močové trubice a močového měchýře a poté následnou extrakci ureterálního stentu, který Vám již byl zaveden při minulém zákroku.

Jde o pružnou dutou cévku, která spojuje ledvinu a močový měchýř.



Toho času již pominul důvod drenáže močovodu, a proto provedeme odstranění stentu /vnitřní drenáže/.

#### Popis zdravotního výkonu

Výkon se provádí obvykle v takzvané litotomické či gynekologické poloze, tedy v poloze na zádech s pokrčenými a roztaženými dolními končetinami. Po dezinfekci zevního ústí močové trubice a následné aplikaci znečítlivujícího gelu se do močové trubice postupně zavádí endoskop neboli cystoskop /flexibilní či rigidní/ až do močového měchýře a posuzuje se vzhled sliznice a stěny močové trubice a močového měchýře a zhodnocuje se možná patologie. Poté následuje extrakce uretrálního stentu. Klíšťkami se uchopí jeho stočená část v močovém měchýři a mírným tahem se provede pozvolná extrakce ureterálního stentu, Postupně je z močového měchýře extrahován ureterální stent i s cystoskopem. Vytažením cystoskopu z močového měchýře je výkon zpravidla ukončen. U žen i mužů lze tento zákrok provést

ambulantně ve slizniční anestezii / není nutné interní předoperační vyšetření/. Na přání pacienta však lze tento zákrok provést i v celkové či svodné anestezii, avšak již za krátkodobé hospitalizace s nutností interního předoperačního vyšetření. Délka trvání tohoto vyšetření je několik minut, vyšetření nebývá příliš bolestivé, ale spíše nepříjemné, zejména u mužů vzhledem k délce močové trubice. Po výkonu je třeba dodržovat pitný režim a klidový režim minim. 24 hodin.

Pokud by 24hodin po výkonu přetrvávaly potíže jako pálení a řezání při močení, bolesti, krvácení a zvýšené teploty, dostavte se k akutnímu ošetření či kontrole na urologii.

### **Komplikace zdravotního výkonu**

Komplikace po tomto výkonu nejsou příliš časté ani závažné. Jde většinou o pocity řezání a pálení v močové trubici, ojediněle může nastat krvácení z močové trubice či prostaty. Obtíže většinou během několika hodin odezní. Jiné komplikace, jako například zvýšená teplota či zástava močení jsou vzácné, ojediněle může po výkonu nastat zánět dolních močových cest / zánět močové trubice s následným vznikem zúžení, zánět močového měchýře, i mužů pak i zánět prostaty, varlat a nadvarlat /. Pokud není zánět dolních cest močových včas léčen, může dojít k rozvoji zánětu i na horní cesty močové /ledviny/ s následným rozvojem celkové infekce organismu, tzv. sepse. Výjimečně může dojít i k drobnému poranění močového měchýře, močovodu či ledviny. K těmto komplikacím přistupujeme s preventivním opatřením u rizikových pacientů. Komplikace se při výskytu dají vždy řešit.

Alternativní postup, který by plně nahradil cystoskopické vyšetření neexistuje.

**Prohlašuji, že jsem byl(a) lékařem úplně a srozumitelně poučen o povaze svého onemocnění a plánovaném výkonu. Byl(a) jsem poučen(a) i o alternativách léčby a možných důsledcích v případě neprovedení tohoto výkonu. Během poučení jsem měl(a) možnost klást lékaři doplňující otázky, a pokud tomu tak bylo, byly mi úplně a srozumitelně zodpovězeny. Jsem si vědom(a) všech rizik i komplikací spojených s tímto výkonem. Byl(a) jsem poučen(a) o tom, že mohu svůj souhlas s výkonem odvolat a také o tom, že odvolání souhlasu není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušování může způsobit vážné ohrožení zdraví nebo ohrožení života. Byl(a) jsem informován(a) a vzal(a) jsem na vědomí, že předpokládaného výsledku uvedeného zdravotního výkonu nemusí být dosaženo. Poučení jsem rozuměl(a) a s výkonem souhlasím.**

**Jméno a příjmení pacienta .....**

**Rodné číslo pacienta .....**

**V Jihlavě dne: .....**

**Podpis pacienta.....**

**Podpis lékaře.....**