

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM


Perkutánní tibiální neurostimulace pomocí přístroje URGENT PC pro léčbu hyperaktivního močového měchýře (OAB).

Co je hyperaktivní močový měchýř?

Příznaky hyperaktivního močového měchýře jsou jedním z nejčastějších zdravotních problémů současné dospělé populace. Jedná se o několik příznaků podmíněných poruchou dolních močových cest, mezi jehož projevy patří časté močení během dne, naléhavé nucení na močení (urgence) s únikem či bez úniku moči a spánek přerušovaný močením (nykturie). Hlavním a subjektivně nejhůře tolerovaným příznakem je naléhavost neboli urgence. Oproti normálnímu stavu dochází k výraznému zkrácení časového intervalu od prvního nutkání k močení po stav velmi intenzivního nucení na močení.

Jakou léčbu budu podstupovat?

Cílem elektrické neuromodulace je odstranit zvýšenou aktivitu močového měchýře označovanou jako hyperaktivní měchýř, zejména pak urgenci. Nervový stimulátor Urgent PC je schválený zdravotnický prostředek, který vychází z toho, že příčinou hyperaktivního močového měchýře jsou poruchy nervového přenosu informací mezi mozkiem a močovým měchýřem. Perkutánní tibiální neurostimulace byla uvedena Stollerem již v roce 1995. Technika spočívá v zavedení velmi tenké akupunkturní elektrody zhruba 5 cm nahoru od vnitřního kotníku, povrchová elektroda se přikládá na plosku nohy, v blízkosti kosti patní. Kritériem správného zavedení elektrody je při stimulaci změna polohy prstů nohy. V průběhu léčby byste neměl/a pociťovat žádnou bolest, účinek proudu se projeví pouze mírným brněním a změnou polohy prstů nohy. Léčba probíhá 1x týdně/1x denně v délce 30-ti minut v průběhu 12 týdnů. Obrázky názorně představují tuto elektromodulační techniku.



Jaké jsou výhody pomoci léčby přístrojem Urgent PC?

Vzhledem k tomu, že nervový stimulátor Urgent PC již prokázal účinnost v léčbě hyperaktivního močového měchýře, je velice pravděpodobné, že se mohou zmírnit příznaky Vašeho onemocnění. Léčba je navíc díky akupunkturní jehle minimálně invazivní a snadno použitelná.

Jaká rizika jsou spojena s léčbou?

Jako každá léčba může i léčba pomocí stimulátoru Urgent PC vést k nežádoucím účinkům nebo zdravotním potížím. Nicméně se očekává, že léčbu budete dobře snášet. Tento odhad je založen na zkušenostech. Mezi doposud hlášené nežádoucí účinky a příznaky patří:

- Bolest způsobená stimulací

Stejně jako u jiných zdravotnických prostředků, i při použití Urgent PC se mohou objevit nové, dosud neznámé nežádoucí účinky.

Jaké jiné možnosti léčby jsou k dispozici?

V léčbě příznaků hyperaktivního močového měchýře se v současné době využívají následující možnosti: konzervativní léčba pomocí léků mírnících dráždivost hladkého svalstva, mezi něž patří anticholinergika a betamimetika. Na specializovaných pracovištích je rovněž ambulantně prováděna léčba pomocí metody nervové stimulace popsané výše. Dále se doporučuje úprava životního stylu, včetně životosprávy, odstranění nebo zamezení příjmu látek dráždivých svalovinu močového měchýře, redukce tělesné hmotnosti. Mezi další možnosti patří rehabilitace a posílení svalů pánevního dna. Ve vybraných případech se aplikuje u části pacientů endoskopicky do stěny měchýře botulinumtoxin.

Prohlašuji, že jsem byl(a) lékařem úplně a srozumitelně poučen o povaze svého onemocnění a plánovaném výkonu. Byl(a) jsem poučen(a) i o alternativách léčby a možných důsledcích v případě neprovedení tohoto výkonu. Během poučení jsem měl(a) možnost klást lékaři doplňující otázky, a pokud tomu tak bylo, byly mi úplně a srozumitelně zodpovězeny. Jsem si vědom(a) všech rizik i komplikací spojených s tímto výkonem. Byl(a) jsem poučen(a) o tom, že mohu svůj souhlas s výkonem odvolat a také o tom, že odvolání souhlasu není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušování může způsobit vážné ohrožení zdraví nebo ohrožení života. Byl(a) jsem informován(a) a vzal(a) jsem na vědomí, že předpokládaného výsledku uvedeného zdravotního výkonu nemusí být dosaženo. Poučení jsem rozuměl(a) a s výkonem souhlasím.

Jméno a příjmení pacienta

Rodné číslo pacienta

V Jihlavě dne:

Podpis pacienta.....

Podpis lékaře.....