

## INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM

### Revize šourku pro syndrom akutního skrota

Revize šourku pro syndrom akutního skrota, tedy náhle vzniklé silné bolesti jedné strany šourku s otokem zarudnutím případně i zvracením jsou důvodem k operační revizi pro podezření na torzi varlete. Torze varlete je obávané onemocnění varlete, při němž dochází k jeho otočení kolem podélné osy, resp. dojde k otočení semenného provazce (cév a chámovodu) a jeho zaškrcení, čímž dojde k částečnému či úplnému zastavení přívodu okysličené krve do varlete. Zárodečné buňky varlete jsou velmi citlivé na nedostatek kyslíku a po cca 6 hodinách nenávratně odumírají. Proto je nutno při podezření na torzi varlete doporučit a v co nejkratším čase provést pacientovi operační zákrok.

#### Popis zdravotního výkonu

V poloze na zádech se z krátkého příčného řezu na šourku zpřístupní varle a semenný provazec, v případě potvrzené torze se varle otočí do správné polohy a v této poloze je fixováno stehem ke stěně šourku. Tak se preventivně předejde další torzi. Stejným způsobem se fixuje i druhé varle jako prevence torze na této straně v budoucnu, zpravidla v odstupu od revize, dalším drobným výkonem. Pokud jsou při operační revizi známky nežitvosti varlete, je nutno toto varle odstranit, protože toto nefunkční varle se může stát cílem autoagresivní reakce organismu proti zbylému, dosud zdravému varleti. Ne vždy jsou „typické“ známky svědčící pro možnost torze spojeny s touto příčinou, někdy se může obdobně projevovat zánět varlete a nadvarlete, případně málo nebezpečná torze přívěsku varlete. Proto jsou tyto potíže souhrně označovány jako příznak (syndrom) akutního skrota, neboť příčin jak bylo uvedeno může být více. Avšak pokud má vyšetřující lékař podezření na torzi je plně indikována operační revize, v zájmu záchrany varlete! Výkon je proveden v anestézii celkové (budete spát), svodné (budete při vědomí, ale bolest nebudete vnímat). Není příliš časově náročný, délka výkonu cca 30 minut, ale závisí na operačním nálezu.

#### Komplikace zdravotního výkonu

Komplikací může být krvácení a vznik hematomu ve stěně či v okolí varlete, poranění varlete, infekce v ráně s event. přechodem zánětu na nadvarle a varle, proto je výhodnější fixaci zdravého varlete provést v odstupu. Pokud je krvácení intenzivnější, je nutno ho řešit operační revizí. Vzhledem používání vstřebatelného šicího materiálu není nutno extrahovat stehy, ty přibližně do 14 dnů vypadnout samy.

Pobyt v nemocnici je cca 3 dny, rekonvalescence trvá 2-3 týdny.

**Prohlašuji, že jsem byl lékařem úplně a srozumitelně poučen o povaze svého onemocnění a plánovaném výkonu. Byl jsem poučen i o alternativách léčby a možných důsledcích v případě neprovedení tohoto výkonu. Během poučení jsem měl možnost klást lékaři doplňující otázky, a pokud tomu tak bylo, byly mi úplně a srozumitelně zodpovězeny. Jsem si vědom všech rizik i komplikací spojených s tímto výkonem. Byl jsem poučen o tom, že mohu svůj souhlas s výkonem odvolat a také o tom, že odvolání souhlasu není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušování může způsobit vážné ohrožení zdraví nebo ohrožení života. Byl jsem informován a vzal jsem na vědomí, že předpokládaného výsledku uvedeného**



Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 59, 586 01 Jihlava

**Urologické oddělení**

MUDr. Ženíšek Jaroslav Ph.D., primář

**zdravotního výkonu nemusí být dosaženo. Poučení jsem rozuměl a s výkonem souhlasím.**

Jméno a příjmení pacienta .....

Rodné číslo pacienta .....

V Jihlavě dne: .....

Podpis pacienta.....

Podpis lékaře.....