

## INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM

### Optická uretrotomie (OUTI, optická uretrotomie interna)

Optická uretrotomie (OUTI) je mini invazivní endoskopická operační metoda k řešení zúženin močové trubice.

#### Popis zdravotního výkonu

Speciální endoskopický přístroj – optický uretrotom – se pod kontrolou zraku zavede k zúženině močové trubice, kterou se provlékne tenká cévka sloužící jako vodič a po ní se k zúženině posunuje nůž uretrotomu. Nůž „za studena“, tedy bez použití elektrického proudu, protne zúženinu a umožní tak skrz ni zavést silnější samotný přístroj a následně močový katétr. Na tomto katétru se zúženina roztáhne a zhojí a zajistí se také v pooperačním průběhu odtok moči z močového měchýře. OUTI se provádí u zúženin močové trubice, které se nalézají mimo oblast penisu. **Je určena hlavně pro řešení zúženin u pacientů, kteří vzhledem k vedlejším chorobám nemohou podstoupit rekonstrukční plastickou operaci močové trubice. Samotný výkon až na výjimky není léčebný, ale pomocný.** Bez navazující dilatace pomocí speciálních katetrů, které si zpravidla pacient naučí sám zavádět 1x týdně, dochází velmi často k recidivám zúženin, a navíc k prodloužení jejich délky.

Cévka se po výkonu ponechává max. 5 dní, po odstranění cévky je nutné naučit pacienta autodilatace (zavedení a vytažení speciální cévky), která zabezpečí trvalou průchodnost přes zúženou část močové trubice. Je doporučeno dostatečně pít, určitou dobu může mít pacient nepříjemné pocity při močení, které přes autodilatace po několika týdnech mizí.

Doba rekonvalescence je 3-4 týdny, někdy i kratší.

#### Komplikace zdravotního výkonu

Během samotného výkonu může dojít ke krvácení při poranění močové trubice, event. s její perforací do houbovitěho tělesa, nebo k poranění hrdla močového měchýře. Po operaci může dojít k rozvoji močové infekce s nutností podávání antibiotik. Výjimečně při ošetření jizvy v oblasti hrdla měchýře může dojít přístrojem k perforaci měchýře a k průniku do břišní dutiny, kdy je indikována neodkladná operační revize a uzavření otvoru v močovém měchýři, perforace mimo břišní dutinu se dá řešit dlouhodobým ponecháním drenáže měchýře močovým katetrem, při větším poranění např. spojené s poraněním cév v okolí močového měchýře je opět nutná otevřená revize. Po výkonu může vzniknout inkontinence čili neudržení moči. Jako každý výkon spojený s instrumentací v močové trubici může vyvolat u mužů infekci zevních pohlavních orgánů – varlat a nadvarlat. S tím je spojeno riziko zajizvení semenných cest a neplodnosti, infekce si někdy vyžádá otevřenou revizi s ev. odstraněním varlete a nadvarlete. Infekční či traumatické změny v močové trubici a následně v houbovitěm a v topořivých tělesech penisu mohou vyvolat poruchy erekce až úplnou impotenci muže. V rámci operačního výkonu může dojít k zánětu hlubokých žil dolních končetin, vzniku trombózy žil dolních končetin či pánve a následně i k plicní embolii. Plicní komplikace (zánět plic a dýchacích cest) se mohou vyskytnout zejména v souvislosti s celkovou anestézií. Srdeční komplikace se mohou projevit poruchami srdečního rytmu či zhoršením prokrvení myokardu (srdečního svalu).

Alternativou k tomuto výkonu je ošetření laserem, které se opět doplňuje autodilatacemi, krajní možností je trvale zavedený permanentní katétr, který je nutné pravidelně měnit po 4 týdnech.

Prohlašuji, že jsem byl(a) lékařem úplně a srozumitelně poučen(a) o povaze svého onemocnění a plánovaném výkonu. Byl(a) jsem poučen(a) i o alternativách léčby a možných důsledcích v případě neprovedení tohoto výkonu. Během poučení jsem měl(a) možnost klást lékaři doplňující otázky, a pokud tomu tak bylo, byly mi úplně a srozumitelně zodpovězeny. Jsem si vědom(a) všech rizik i komplikací spojených s tímto výkonem. Byl(a) jsem poučen(a) o tom, že mohu svůj souhlas s výkonem odvolat a také o tom, že odvolání souhlasu není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušování může způsobit vážné ohrožení zdraví nebo ohrožení života. Byl(a) jsem informován(a) a vzal(a) jsem na vědomí, že předpokládaného výsledku uvedeného zdravotního výkonu nemusí být dosaženo. Poučení jsem rozuměl(a) a s výkonem souhlasím.

Jméno a příjmení pacienta .....

Rodné číslo pacienta .....

V Jihlavě dne: .....

Podpis pacienta.....

Podpis lékaře.....